

Messieurs

une absence nécessaire, de la quelle je ne puis de retour que depuis
avant hier, m'a empêché de répondre plutôt à votre lettre par la quelle
vous témoigniez un empressement obligeant à recevoir les observations
particulières que j'ai faites sur la cure des hernies avec gangrène, et vous
me sollicités à vous communiquer les raisons qui me font préférer la réunion
des extrémités de l'intestin à la méthode des anneaux artificiels.

J'ai déjà eu l'honneur de vous marquer que mes occupations me
laissent à peine quelques moments pour vaquer à ce genre d'ouvrage
en effet je suis dans un hôpital fort grand, où le nombre des malades
est considérable, vous le connoissez, ainsi vous n'avez pas de peine à vous
persuader que ce poste me tient continuellement en haleine surtout si
vous observez que je suis obligé d'y faire régulièrement des leçons pour
les élèves en chirurgie qui me sont confiés. D'ailleurs je vous ai déjà
avoué que je n'avois pas une certaine facilité pour écrire, et que quand
il s'agissoit de concilier sur le papier avec netteté des faits et des réflexions,
j'étois obligé d'y penser plus que d'une fois.

Tous ces motifs, m'auroient pu être servis d'excuses légitimes,
s'il étoit possible de se refuser à la manière obligeante et flatteuse
dont vous sollicitez des choses pour les quelles vous n'avez qu'un
généreux intérêt.

Pour ne pas abuser de votre complaisance, je débute, si c'est
avec quelque confiance, ce n'est pas que j'ignore que je dois me défier de
mon expérience et de ma jeunesse, mais je ne pourrois pas me persuader
qu'en cette occasion on il s'agit de preuves de faits, tous mes sens fussent
liés pour me tromper, en le cas l'expérience, qui est le soleil de notre
art, ne seroit plus qu'un château de cartes.



12
Votre memoire est un examen judicieux des differentes methodes
pour la cure des hernies avec gangrene à la fin duquel vous concluez
en faveur des anus artificiels aumoins dans le plus grand nombre
des cas. la maniere dont vous traitez cet objet, est seduisante, et
auroit surement entraîné son hommage que j'accorde avec
plaisir au merite de vos productions. mais une observation a
pu vous echapper, et c'est sur ce fondement en effet que j'appuie
mon opposition a votre consequence.

je ne vous decouvrirai point que j'avois cru, et que
je croirois encore si je n'avois lu votre memoire, qu'on n'avoit
tenté la reunion des extremités de l'intestin gangrené, que
parcequ'on s'étoit mal trouvé d'avoir voulu procurer une
nouvelle porte a l'excretion habituelle des matieres fecales.
le mecanisme des fonctions des intestins me sembloit avoir dû
concourir a dissuader cette derniere methode pour établir la premiere
mais vos recherches m'ont desabusé et je comprends actuellement qu'on
n'a pas raisonné conséquemment à ce mecanisme. Comme je tache
de le faire bientôt, et que la reunion des intestins n'a pas été tentée
expressément pour éviter les inconveniens des anus artificiels.

C'est pourquoi sans parler des accidents que vous imputez a la reunion
et que je me reserve de discuter cy après, je vais en discuter aux anus
artificiels qui aumoins balanceront d'abord le jugement qui doit decider
entre les deux methodes. ensuite j'éclaircirai, je reduirai a leur juste
valeur les raisons pour et contre, je les mettrai en comparaison, après
quoi j'espère que vous me permettrez de conclure que l'on doit toujours
tâcher de reunir les extremités d'un intestin gangrené pour rendre
aux excremens leur issue naturelle a l'exclusion de la dangereuse
methode de leur ouvrir une nouvelle porte par l'extremité de l'anus

portion supérieure de l'intestin, fixée aux bords de la plaie.

Cette conclusion ne regarde que les cas où l'une des deux méthodes doit avoir lieu.

Lorsqu'après la séparation de la portion gangrénée d'un intestin, on a fixé son extrémité qui répond à l'estomach, aux bords de la plaie pour y servir de nouvel anus; l'ot ou tard cet intestin sort en dehors en se renversant en lui même, et souffre aussi, l'ot ou tard en cet état un étranglement, suivi de gangrène, pourriture et sans remèdes.

principal inconvénient dont on sentira bientôt le danger, et les suites funestes.

il s'agit de constater d'abord l'existence, l'expérience m'en fournira les preuves.

Observations.

Le 1^{er} avril 1752 on transporta dans cet hôpital une femme âgée de 42 ans, qui avoit déjà souffert l'opération du bubonocèle, dans le courant du mois de jbre 1751 pour une hernie inguinale avec étranglement du côté gauche. la répugnance invincible de la malade pour l'opération avoit été cause que l'intestin avoit eu le tems de se pourrir; en conséquence le chirurgien avoit emporté toute la portion altérée, et après s'être assuré par l'issue des excréments de l'extrémité de l'intestin qui répondoit à l'estomach, il l'avoit fixée aux lèvres de la division.

Cette femme s'étoit rétablie assez promptement de l'inconvénient près du nouvel anus et d'une boîte de fer blanc attachée par une ceinture, et destinée à recevoir les excréments qui sortoient involontairement mal digérés (*) et très souvent en diarrhée quoiqu'elle eût la précaution de manger peu et souvent. l'excrétion ne se faisoit sans aucune douleur pincante presque toujours accompagnée du renversement de l'intestin que la malade faisoit rentrer après l'avoir fomentée avec du vin chaud et du sucre, et qu'elle maintenoit au moyen d'une compresse appliquée pendant quelques heures sur l'ouverture. elle avoit

(*) cette circonstance sera l'objet d'une attention particulière.



été menacée plusieurs fois d'étranglement dans ces différentes sorties de l'intestin, mais le danger dissipé elle ne laissoit pas que d'agir et de s'occuper à quelques petits ouvrages peu fatigants. jusqu'à ce que — enfin à l'époque de son entrée en cet hôpital seulement dès le matin de ce jour là l'intestin sortit de plus d'un demi pied; la malade souffroit des douleurs cruelles accompagnées de hoquet et de vomissement, le visage étoit livide, le pouls concentré; et convulsif, l'intestin d'un rouge brun, enfin tous les plus fâcheux symptômes de l'étranglement réunis pour rendre son danger plus pressant.

Je convoquai quatre maîtres en l'art, et je mis en délibération quel secours il convenoit de lui donner. il ne s'offroit que ^{l'opération de} ~~la partie~~ de la partie de l'intestin renversée qui étoit hors du ventre. mais on sentit bien tôt, que supposé que la malade soutint encore cette opération ce qui ne paroissoit pas probable, on seroit encore obligé après cela de fixer l'extrémité de l'intestin aux bords de la playe, — ce qui le rendroit toujours sujet au renversement, et qu'ainsi ^{peut} ~~successivement~~ on auroit lieu d'extirper toute l'étendue des intestins grêles jusqu'à l'estomach.

L'art n'ayant donc point fourni de ressource utile et efficace, les progrès de la maladie augmentèrent vers le soir si prodigieusement malgré tous les remèdes tant internes qu'externes, que l'intestin avoit un pied et demi au moins de sa longueur dehors. enfin la malade mourut la nuit qui suivit c'est à dire du 2 au 3. du même mois.

Je fis l'ouverture de son cadavre en présence de Mr Bouteau fils, et des aides chirurgiens de cet hôpital. j'observai d'abord que tous les intestins étoient rouges, livides, gonflés, tendus et presque collés tous ensemble, leur membranes me parurent plus épaisses et plus obscures; je trouvai l'épiploon fondus qui mêlé avec le macilage du bas ventre, imitoient assez cette coque lymphatique qu'on remarque ordinairement après les inflammations

Gangreneuse du bas ventre. cette coëne couvrait le foye et presque tous les intestins des viscères les veines du mésentère étoient pleines d'un sang noir et caillé; enfin je m'assurai bien que l'estomach et le reste des intestins avoient été tirillés, que la circulation y avoit été empêchée, et que la mort en avoit été la funeste suite.

Le 4 août de la même année une paysanne des environs de cette ville, fut amenée en cet hospital, elle étoit dans le même cas que le sujet de l'observation précédente, elle avoit été opérée pour une hernie avec étranglement et pourriture, un anus artificiel donnoit issue aux excréments, l'intestin étoit sujet à sortir et à se renverser, ces accidens fréquents la retenoient au lit depuis trois mois lorsqu'à une de ses sorties survint étranglement, suivi de symptômes dangereux qui déterminèrent les siens à la traduire en cet hospital, mais c'étoit trop tard, elle mourut le même jour avant qu'on eut pu lui essayer aucun secours.

un voyage m'empêcha de faire l'ouverture de son cadavre, mais je suis persuadé que cette maladie étant la même et si semblable à la 1^{re}, cette ouverture n'auroit rien offert de particulier.

Autre observation

Cette observation quoique différente pour les circonstances des premiers tems de la maladie fournit l'exemple de la même terminaison.

Le 20 mars 1753 un garçon ferrurier sujet à une hernie au scrotum du côté droit, fut maltraité par ses compagnons qui le laissèrent meurtre et dans les symptômes les plus urgents d'un étranglement.

On l'apporta dans cet hospital, il avoit le visage d'un rouge brun, le pouls convulsif et concentré, les yeux aigus, vacillants, et s'avancant hors de l'orbite, une sueur continuelle, les extrémités froides la tension du bas ventre, le hoquet fréquent annoncioient le péril pressant du malade. je lui fis d'abord ouvrir la veine, et je convoquai m. mrs. qui décidèrent bien tôt pour l'opération. j'y procédai sans



6 perdre de tems, et je trouvai dans le sac un gros paquet d'epiploon avec une portion considerable d'intestin grêle. apres avoir dilaté l'anneau, j'extirpai l'epiploon en entier, et ne trouvant pas l'intestin assez altéré pour ne pouvoir se rétablir dans le ventre, je m'efforçai de le réduire: mais ce fut en vain. Car lors qu'une portion rentroit il en ressortoit une autre aussi considerable. on ne pouvoit attribuer cet effet qu'à la plénitude des intestins et à la tension du bas ventre. Ce motif me fit proposer d'ouvrir l'intestin pour donner issue aux matieres qu'ils renfermoient. on ne fut point de cet avis, et on se contenta de lui faire faire des fomentations et de lui donner des lavement, le malade ne le rendit pas, et les symptomes firent de nouveaux progrès, le pouls s'éleva, l'oppression s'accrut; se de sorte que persuadé que le malade alloit perir par la gangrene des intestins qui se seroit étendue, je résolus de lui donner des secours plus efficaces. je consultai pour cela mr Laure's qui se rendit a l'hôpital. ce celebre chirurgien n'hésita point à me faire executer ce que j'avois proposé quelques heures plutôt. a peine eus je ouvert l'intestin qu'il en sortit plus de deux litres d'un sang noir grumelé et déjà très fétide sans aucun excrement. Ce ne fut pas tout, et mr Laure's voyant que les intestins étoient très noirs et très mortifiés il fut d'avis que j'extirpas tout ce qui étoit altéré en consequence en tirant successivement il s'en trouva près de trois pieds environ que j'extirpai. je passai ensuite un fil dans le mentere un peu avant vers les parties saines qui s'approcha les deux bouts de l'intestin, j'écartai les deux, j'écartai les deux en distinguant cependant celui qui répondoit à l'extrémité supérieure de l'intestin d'avec l'autre, je les fixai, au dehors de la plaie une hemorrhagie qui survint degagea le ventre et depuis ce tems le malade commença a se trouver mieux.

je ne mis point les extrémités de l'intestin l'une dans l'autre, — parce que ces parties mutilées et un peu contuses me sembloient devoir

7 suppurer, je me contentai de les tenir rapprochés par le moyen des fils dont j'ai parlé.

J'administrai au malade les minoratifs par intervalles, et trente jours après ^{l'évacuation des} ~~les~~ matières étoit déjà partagée, et elles sortaient autant par les voyes naturelles que par la plaie; on étoit déjà moins severe pour le regime, lorsque quelques compagnons du malade lui apportèrent du vin et des aliments peu convenables à son état; il but et mangea avec eux au delà de saturation, ce ne fut pas impunément, car le soir du même jour qui étoit le 24 avril, il fut saisi d'un frisson des plus violents, qui fut suivi d'une diarrhée compliquée de la sortie de l'intestin par renversement: je n'oubliai rien de ce que je crus pouvoir le soulager. mais mes soins furent inutiles le hoquet continu, la tension de tout le bas ventre et le delire terminerent sa vie en moins de 56 heures.

J'euvris son cadavre en presence de bien des personnes de l'art, et j'observai 1° que les deux bords du mesentere qu'avoit laissé l'extirpation et la foliation d'une de ses portions étoient resserés et cicatrisés ensemble. 2° que les deux extremités de l'intestin reunies l'une à l'autre et adaptées de façon que la capacité du canal n'étoit point interrompue, étoient collées ensemble de même qu'avec l'épiploon qui garantissoit la cicatrice par derrière en y formant une espece de nœud.

Je conclus de là qu'on ne devoit imputer la mort du malade qu'à son imprudence, puisque l'intestin à l'endroit de la cicatrice étoit assez solide pour résister à l'abord des matières fecales poussées par l'action des muscles du bas ventre, par celle du diaphragme, par la contraction de l'estomach et des membranes du conduit intestinal.

Dans ces trois observations le renversement de l'intestin semble être un accident inévitable à la suite de l'operation, neantmoins ce renversement n'a point eu de causes particulières et determinantes qui

8 ne puissent se offrir dans tous les autres cas des anus artificiels; cela suppose comme il est vrai, les suites funestes ne mériteroient elles pas une sérieuse attention.

mais avant que d'entrer dans le mécanisme de la renversement suivons l'expérience, et après avoir énoncé les cas propres au sujet, voyons ceux qui y ont du rapport. ainsi nous raisonnerons par comparaison à majori ad minus.

Les intestins grêles peuvent bien être sujets à se renverser, si les gros y sont sujets eux mêmes je dis plus et parmi ces derniers le colon se renverse plus facilement que le rectum. La raison de cette différence quoique d'ailleurs très sensible se verra cy après; or ne sçait on pas que le rectum quelquefois se renverse et sort en de hors de façon à entraîner souvent de dangereux symptômes. Cette hernie du rectum n'est pas rare aux femmes et aux filles, est fréquente aux enfans travaillés du calcul, et arrive aux adultes après les diarrhées épidémiques.

L'expérience en cet homme en bien d'autres cas ne m'a pas laissé manquer de preuves, mais entre autres lorsque j'écrivois celui cy je n'en avois vu encore d'aussi considérable.

observation.

Un coutelier appelé claud deville âgé de 40 ans, vint en cet hôpital Le 7. 8bre 1752 il se plaignoit d'une violente colique, mais le hoquet, le vomissement des matières fécales, la lividité du visage les extrémités froides la tension du bas ventre firent soupçonner à celui des médecins qui le virent d'abord, que des symptômes fâcheux avoient quelque autre cause. je fus en conséquence chargé de vérifier s'il n'avoit point d'hernie, je le visitai, et je reconnus que l'intestin rectum renversé sortoit d'environ six travers de doigt, je n'allai pas chercher d'autre cause de tous les accidents dont j'ai parlé; je fis administrer d'abord au malade une lavement emollient, et une potion tempérante avec 13 gouttes anodines.

Ce seul moyen calma les accidents, et le lendemain je fis la réduction de l'intestin. les mêmes remèdes continués rétablirent

9 Le malade en peu de jours.

mais Le 14^e jour suivant une indigestion renouvelée le mal avec tous les symptômes dans un degré plus violent, le malade revint à l'hôpital, je lui donnai tous mes soins, lavements, potions, fomentations rien ne fut oublié, mais tout fut inutile, je ne pus réduire l'intestin qui sortoit de la longueur d'un pied il se gangrenait et le malade mourut la nuit du 16 au 17 après avoir souffert des douleurs cruelles et très aiguës.

Je fis l'ouverture de son cadavre aidé d'un des chirurgiens de cet hôpital, je m'étois bien attendu à y trouver un ou plusieurs volvulus, mais mes découvertes passèrent de beaucoup mes conjectures, et je vis avec une surprise des plus grandes que le colon tout entier rentré dans lui-même étoit renversé et enroulé dans le rectum, - avoit entraîné avec lui le caecum et la portion de l'iléum qui lui est contiguë de sorte que cette portion de l'iléum étranglée et fortement reserrée dans le caecum comprimé au milieu des trois replis du colon formoient un volume semblable à celui d'un faucisson de boulogne qui sortoit de l'aune de pres d'un pied de longueur. les parois de ces intestins avoient plus de deux lignes d'épaisseur, les veines fort dilatées étoient remplies de caillots d'un sang noir et grumele. toute la vésicule du fiel extrêmement pleine de bile noire. enfin le mésentère et tous les viscères du bas ventre étoient engorgés et livides. on sent combien le mesocolon devoit s'être prolongé; étant si étendu, le mésentère étranglé, le ^{retour} cours du sang intercepté dans toutes ces veines; il en falloit bien moins pour causer la mort.

Ce prodigieux bouleversement des intestins ne laisse rien à désirer pour la preuve dont il s'agit icy, les gros intestins quoique forts et épais sont renversés et repliés d'une manière surprenante, le rectum se trouve hors du ventre par un semblable renversement. neant moins ce dernier est court et fort, ses tuniques sont épaisses, il est appuyé et maintenu dans sa place par les parties environnantes qui forment une résistance fixe, il est de plus affermi par trois bandes ligamenteuses suivant la direction de son canal.

10 s'étonnerait on après cela que les autres intestins qui sont fort souples, libres et flottants dans la cavité de l'abdomen, sujets d'ailleurs à des valvules, à des renversements sans hernie, s'étonnerait on d'irre si déterminé par l'abord des matières et en conséquence de leur structure qui offre sa et la des-valvules, c'est à dire des points de résistance, ils avancent, se renversent, et sortent pour donner issue à ces matières et s'en décharger par la plaie que laisse l'opération du bubonocèle à la région inférieure du ventre qui est la région vers la quelle il sont déterminés par leur poids, et par la moindre résistance.

À n'avoir égard qu'à ces raisons, on sent que ce renversement est très facile, et on n'est plus tenté de douter de sa possibilité surtout si on y ajoute la compression des muscles du bas ventre, l'action du diaphragme et celle de la membrane musculaire des intestins mêmes, la surface interne de la portion de l'intestin contigue aux lèvres de la plaie s'avance d'abord et en se renversant fort peu à peu, jusques à ce qu'elle successement et par degré une portion considérable se trouve dehors; de là tous les Accidents qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer.

Croirait on que l'expérience qui m'a donné lieu de faire ces observations ne les a fournies qu'à moi. l'accident dont il s'agit a dû être fréquent à raison de toutes les causes qui y concourent. par conséquent beaucoup d'autres l'avoient déjà observé; je puis bien m'étonner après cela qu'on n'y ait pas fait assez d'attention relativement aux anus artificiels pour en faire un motif d'exclusion à cette méthode, ses suites ne sont elles pas funestes et assez dangereuses pour balancer en particulier les inconvénients que vous attribuez à la réunion des bouts de l'intestin.

un autre accident propre aux anus artificiels, c'est que les aliments sortent par leur nouvelle issue, amollis, digérés, et presque toujours en diarrhée. L'expérience qui le prouve s'accorde en cela avec les phénomènes et le mécanisme de la digestion.

En effet on sait que les intestins forment un conduit libre.
* Mr Lottin, flumant, et d'autres dans cette ville.

II et flottant dans la cavité de l'abdomen, plissé en zig-zags, et faisant plusieurs circonvolutions, de façon qu'il s'y rencontre assez ordinairement 28 angles, savoir 26 aux grêles, et deux aux gros, le conduit a environ 36 à 37 pieds de longueur dans un adulte, sauf la proportion de l'âge.

Cette longueur et les circonvolutions sont nécessaires pour que la digestion qui se perfectionne dans les intestins ait le tems d'exprimer tout le chyle des aliments qui parcourent alors un plus long espace, les angles et les valvules concourent aussi au même effet en retardant le cours progressif de ces matières qui sont obligées en plusieurs endroits de remonter contre leur propre poids, de sorte que celles qui sont les plus avancées dans le conduit, et arrêtées par les angles et par les valvules soutiennent l'effort de celles qui suivent lorsqu'elles sont impétueusement poussées par l'action du ventricule du diaphragme et des muscles de l'abdomen, il faut ajouter a tout cela la résistance qu'oppose la valvule musculaire du caecum dans le quel les aliments ne se jettent que par une voie oblique.

Or n'est il pas constant que tant de précautions prises par la nature de la nature pour prolonger leur séjour dans ces viscères, ont eu pour but d'exposer plus long tems ces substances à la chaleur du bas ventre, à l'action des lauses qui concourent à les broyer et à les mêler avec les humeurs digestives dont leur route est arrosée. Ces précautions étoient utiles, elles étoient aussi absolument nécessaire.

Donc les matières qui s'évacuent par un anus artificiel, ayant eu un espace plus court à parcourir, ayant fait moins de séjour dans les intestins qu'il ne convenoit, doivent être mal conditionnées et plus mal digérées encore, d'où résultent tous les accidents anémis au défaut de digestion.

et à cet égard je remarque, que la différence de longueur des intestins ^{des humains} dans les anus artificiels est de 17. 18. 24 ou 30 pieds environ comparée a 36 ou 37. on n'aura pas de peine a comprendre

Cette différence étendue d'intestin dans les différentes hernies, si l'on fait attention que la portion d'intestin comprise dans les entéro-mphales est assez ordinairement la portion moyenne des intestins grêles, que les bubonnelles du côté gauche sont formées par un intestin bien plus éloigné de l'estomach et qu'en consequence un anus artificiel du côté droit favoriseroit plus la digestion, parceque dans ces hernies est ordinairement comprise la portion de l'écum qui s'abouche avec le caecum, ou le caecum lui-même, et qu'ainsi l'espace que les aliments ont à parcourir ~~est~~ plus grand de 8 ou 10 pieds et même plus, que dans les autres hernies, ~~ce n'est~~

de font ce pas la Monsieur des inconvenients réels, propres à votre méthode, le dernier ne feroit il pas de quelque consequence, ses effets sont lents il est vrai, mais ils n'en sont pas moins funestes. et le premier, je veux dire la sortie de l'intestin ^{renversé} ne l'emporte-t-il pas sur les accidens que vous attribuez à la reunion, il est mortel, vous en avez les preuves dans mes observations s'il vous en faut pour vous le persuader, et ceux cy examinés de près ne sont pas si dangereux, j'ose même dire qu'il est des moyens ou pour les prevenir, ou pour y remedier.

En premier lieu la cause la plus ordinaire qui fait perdre le fruit de la cure operée par la reunion est l'inexactitude du malade à observer le regime convenable, mais cela appartient il à l'opération, le regime plus ou moins severe, n'est il pas pour tous les convalescents un presentatif necessaire, il est un peu gênant, mais on est trop hureux à ce prix d'être à l'abri des dangers. on le fera infalliblement par son moyen si d'ailleurs dans l'opération de la reunion, on a pris les precautions necessaires pour empêcher que la portion du conduit intestinal qui repond à l'anus ne se retrecisse, les precautions ne sont pas bien difficiles, car il resulte de vos observations mêmes et des exemples que vous avez apportés du succès de la méthode que je defends, que les suites en étoit heureuses lorsque par l'usage des lavemens administrés exactement dès

Le premier jour de l'opération, ce qu'on avoit ~~contenu~~ tenu la souplesse
de l'intestin, et qu'on étoit parvenu, à faire suivre d'abord à une
partie des matières les cours ordinaires.

on peut donc souvent prévenir les accidents que vous
imputez à la réunion. ne pourroit on pas y remédier lorsqu'il n'est
plus temps de les prévenir, de violentes coliques annoncent une rupture
~~prochaine~~, et un épanchement prochain, de plus fâcheux symptômes
rendent le danger pressant, on presume que c'est la cicatrice
des extrémités réunies qui est le siège et la cause du mal. on ne
peut gueres en avoir de signes bien positifs, mais positifs ou non, après
avoir essayé tous les autres moyens s'ils sont inutiles, ne pourroit on
pas faire une ouverture comme pour une nouvelle opération, afin
de donner issue aux matières épanchées et nettoyer la partie qui les
renferme par des injections d'eau tiède avec le miel ou le sucre
jusques à ce que on put donner des lavements.

Le danger de ma méthode n'est donc pas si réel que l'on est
tenté de le croire quand on a lu votre mémoire, j'y trouve des
recourses contre les accidents, et je n'en trouve point contre le
renversement d'intestin qui est ordinaire aux anus artificiels. votre
méthode pourra donc à être comparée à la mienne; puis-je croire
que vous en conviendrez.

En cette la cure par réunion ^{des hernies avec gangrène} sans récidive n'est pas si rare
que vous semblez l'insinuer. j'ai des observations à vous communiquer
elles termineront ce que j'ai à dire.

Observations.
une fille domestique à la campagne atteinte d'une hernie
inguinale du côté gauche fut apportée dans cet hôpital, elle avoit
souffert l'étranglement assez longtemps et la pourriture avoit gagné
l'intestin et les teguments; ses limites étoient marquées, et après avoir
scarifié la peau et la graisse, je fis appliquer des cataplasmes.

14 L'intestin étoit déjà percé, et les matières avoient infusé par le milieu de l'ulcère. le 2^e jour du traitement, je détachai l'écarré des teguments et du tisse cellulaire, l'ulcère se détachait. l'ouverture de l'intestin parut mais au moyen des laxatifs administrés fort souvent dès le commencement de la maladie, les excréments reprirent leur route naturelle, la cicatrice se forma insensiblement, et avant deux mois la malade fut guérie absolument et solidement sans avoir cependant observé un régime austère.

en 1753 monsieur Colomb lieutenant de Mr Le premier chirurgien du roy, et chirurgien très recommandable a vu avec moi une dame de la paroisse St George a qui le même cas est arrivé qui en est guérie par nos soins après avoir rendu les matières pendant près de deux mois par l'aîne droite, qui a toujours jouit depuis d'une très bonne santé et qui contre notre attente est fort heureusement accouchée l'année passée.

Le nommé Reveronj âgé de 40 ans étoit détenu dans cette maison pour cause d'aliénation d'esprit. il étoit sujet à une hernie au scrotum du côté gauche qui ne l'avoit point encore incommode, mais le jour de la fête de dieu 1758 il survint un étranglement à l'intestin et à l'epiploon qui formoient cette hernie. Cette maladie entraîna de bord tous ses symptômes ordinaires, mais le sujet n'étoit pas en état de se plaindre, et l'on ne s'apperçut de son danger que par l'infection que cauvoit la pourriture des teguments et des parties déplacées.

J'ouvris la tumeur en présence de Mrs Bouteau fils et faure, et je trouvois en premier lieu une portion considérable d'epiploon noir et gangrené que j'extirpai entièrement et plus de trois pie-

Intestins qui étoient aussi corrompus et putréfiés, je parvins à un
fil dans le mésentère qui en le serrant tenoit les extrémités des
intestins rapprochées, comme les matières fécales s'évacuoient
continuellement par la plaie; je me contentai de la faire couvrir
de compresses blanches et changées trois fois par jour.

Comme je n'avois jusqu'alors coupé et extirpé que
dans les parties mortifiées, je n'eus point d'hémorragie, mais huit
jours après l'opération en détachant le reste de la pourriture en entraînant
une considérable par le mésentère qui relâcha beaucoup le ventre
jusques à le fort enfler et fort tendre. cette hémorragie s'arrêta
facilement, soit par le strict en poudre que je soufflai sur les vaisseaux
ouverts, soit par la faiblesse du malade, au reste elle fut si salutaire
au malade qu'elle lui rendit l'usage de ses sens et de sa raison,
ou du moins qu'elle fut l'époque de ce rétablissement qui a été solide.
il revint comme d'une espèce de léthargie, ne se ressouvenant ni de
l'opération ni de son état précédent, il reprit appétit, et je lui
permis par degrés et peu à peu l'usage des aliments. tous les jours
on lui administroit un lavement qui entretenoit la liberté de
la portion inférieure des intestins et leur souplesse, neant moins,
n'ayant jamais pu se contenir de manger prodigieusement et en cachette
Les matières continuèrent à sortir ^{par la plaie} pendant deux mois entiers, jusques à
cette époque ayant été purgées elles commencèrent à se partager
et à sortir en partie par la voie naturelle. insensiblement la
quantité de celles qui avoient repris le cours augmenta, les portions
du mésentère coupées et rapprochées par le moyen des fils se cicatrisèrent
la cicatrice extérieure avança aussi et fut parfaite un mois après.
le malade sortit alors de l'hôpital bien engraissé et bien portant.
mais deux mois après le malade eut un excès fit rouvrir la cicatrice

en dehors, il vint me retrouver et je lui fis faire une boîte de
fer blanc qu'il a portée jusqu'à ce que peu de tems après la
cicatrice se reformât toute seule et se referma si solidement
qu'elle ne fût plus rouverte.

puis je me flatter d'avoir rempli votre attente et
m'entretenir dans votre estime, est dans ces sentimens que
j'ai l'honneur D'être

Monsieur

Votre très humble
et très obéissant serviteur

à l'hôtel Dieu de Lyon le 12^e

avril 1759

Puy

